



Πρόεδρος
Δ. ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ
Καθηγητής Παν. Αθηνών

Αντιπρόεδρος
Α. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ
Καθηγητής Παν. Αθηνών

Γεν. Γραμματέας
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών

Ειδικ. Γραμματέας
Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ
Καθηγητής Παν. Αθηνών

Ταμίας
Ν. ΒΛΑΧΟΣ
Καθηγητής Παν. Αθηνών

Μέλη
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Καθηγητής Παν. Θεσ/κης

Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Καθηγητής Παν. Πατρών

Ε. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Α. ΜΟΡΤΑΚΗΣ
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών

Δελτίο Τύπου

Θέμα: «Εμβολιασμός για τις γυναίκες Αναπαραγωγικής Ηλικίας»

- Η κύηση θεωρείται παράγοντας Υψηλού Κινδύνου νόσησης από SARS-CoV-2:
- Η ΕΜΓΕ συστήνει τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 όλων των εγκύων γυναικών και ειδικά αυτών με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης (όπως ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, κ.α.)
- Η ΕΜΓΕ συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 των εγκύων γυναικών με συννοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου σε περίπτωση λοίμωξης (όπως διαβήτη, καρδιολογικών και αναπνευστικών νοσημάτων και παχυσαρκίας κλπ.)
- Ο εμβολιασμός συστήνεται κατά την διάρκεια της κύησης σε όλα τα τρίμηνα.
- Αναφορικά με την επιλογή εμβολιαστικού σκευάσματος προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας mRNA για την κύηση, καθώς τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αφορούν κυρίως αυτή την κατηγορία εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 χωρίς όμως να αποκλείονται και οι άλλοι τύποι εμβολίων.
- Η χρήση εμβολίων με αδρανοποιημένους ιούς έναντι SARS-CoV-2 δεν αναμένεται να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες στην κύηση παρά την έλλειψη σχετικών δεδομένων
- Δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός, με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου των γυναικών που θηλάζουν. Ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό της μητέρας έναντι COVID-19 και ενδέχεται να προσφέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογνό.
- **Η ΕΜΓΕ συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου, όλων των γυναικών που είναι σε προσπάθεια εγκυμοσύνης στο άμεσο μέλλον , η βρίσκονται σε διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.**
- Δεν συστήνεται τροποποίηση του προγραμματισμού εγκυμοσύνης με

Μέλος της FIGO & του EBCOG

βάση τη χορήγηση οποιουδήποτε από τα εμβόλια έναντι COVID-19, δεν προτείνεται τροποποίηση του εμβολιαστικού σχήματος εάν μεταξύ των δόσεων του εμβολίου η δέκτης ανακαλύψει ότι είναι έγκυος και τέλος δεν συστήνεται διακοπή κύησης λόγω εμβολιασμού.

- Συστήνεται η ύπαρξη μεσοδιαστήματος 14 ημερών μεταξύ του εμβολιασμού έναντι Covid-19 και των άλλων εμβολίων που πρέπει να χορηγούνται κατά την κύηση με βάση την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΜΓΕ No 32 Ανοσοποίηση Στην Κύηση εκτός αν ο άμεσος εμβολιασμός είναι απολύτως αναγκαίος (πχ εμβολιασμός έναντι τετάνου μετά από τραύμα)

<https://hsog.gr/wp-content/uploads/2021/05/Vaccine.pdf>

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΜΓΕ

Ο Γεν Γραμματέας

Δρ. Π.Πετρόπουλος



Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Δ.Λουτράδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέλος της FIGO & του EBCOG

ΑΛΚΑΙΟΥ 10 • ΑΘΗΝΑ 11528 • ΤΗΛ:2107774607 & FAX: 2107774609

e-mail:helobgyn@otenet.gr • www.hsog.gr